

3. 糖尿病性腎症重症化予防事業 対象と方法の例示（2024年度）

資料7-③

糖尿病未受診者（人）※1

		腎機能												腎機能 血圧区分 判定不可 ※3	総計		
		eGFR<45または尿蛋白(+)以上			45≤eGFR<60または尿蛋白(±)			60≤eGFRかつ尿蛋白(-)									
		血圧区分※2															
		受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計	受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計	受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計				
HbA1c (%)	8.0以上	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	2	3	0	6		
	7.0~7.9	1	0	1	2	0	1	0	1	0	4	4	8	0	11		
	6.5~6.9	2	0	1	3	2	1	5	8	7	4	9	20	0	31		
	6.5未満	200	39	113	352	394	100	418	912	691	264	1,243	2,198	2	3,464		
	合計	203	40	116	359	396	103	423	922	698	273	1,258	2,229	2	3,512		

点線青枠：健診・レセプト情報から糖尿病と判断できないため、糖尿病性腎症重症化予防事業の対象外。（CKD対策、高血圧対策としての受診勧奨・保健指導等は必要に応じて行う）

糖尿病受診中の者（人）※1

		腎機能												腎機能 血圧区分 判定不可 ※3	総計		
		eGFR<45または尿蛋白(+)以上			45≤eGFR<60または尿蛋白(±)			60≤eGFRかつ尿蛋白(-)									
		血圧区分※2															
		受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計	受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計	受診中	血圧高値 受診なし	正常範囲	合計				
HbA1c (%)	8.0以上	18	1	3	22	6	1	3	10	13	5	9	27	1	60		
	7.0~7.9	33	1	1	35	24	2	9	35	49	5	21	75	0	145		
	6.5~6.9	32	3	3	38	33	0	4	37	56	9	20	85	0	160		
	6.5未満	81	4	9	94	91	13	35	139	171	15	74	260	1	494		
	合計	164	9	16	189	154	16	51	221	289	34	124	447	2	859		

糖尿病受診中の場合にはHbA1c<6.5%も 糖尿病性腎症重症化予防事業の対象。糖尿病受診中で主治医があるため、高血圧未受診でも受診勧奨ではなく保健指導とする。

 保健指導I	579人	 受診勧奨I	22人	 CKD対策	1,264人
 保健指導II	259人	 受診勧奨II	7人		
 保健指導III	33人	 受診勧奨III	7人	 高血圧受診勧奨	403人

※1 糖尿病受診中の者：出力対象年度に2型糖尿病の受診実績がある者。糖尿病未受診者：出力対象年度に2型糖尿病の受診実績が無い者。

※2 血圧区分の「受診中」：出力対象年度に高血圧症の受診実績がある者。「血圧高値受診なし」：140mmHg≤収縮期血圧または90mmHg≤拡張期血圧に該当し、出力対象年度に高血圧症の受診実績が無い者。

「血圧高値」判定は、収縮期血圧または拡張期血圧のいずれかの測定値のみでも、有所見判定(140mmHg≤収縮期血圧または90mmHg≤拡張期血圧)が可能な者も含む。

※3 腎機能 血圧区分判定不可：HbA1c測定者のうち、尿蛋白、血圧の測定値が無く、腎機能、血圧区分のいずれかの判定ができない者。eGFRの測定値が無い場合は暫定的に「異常なし」と分類。